VACUUM PAUHER

Médico:

Hospital:

Início do tratamento:

DIAGNÓSTICO
PECTUS EXCAVATUM

FORMATO: ○ Simétrico ○ Assimétrico

LADO: ○ Esquerdo ○ Direito

PACIENTE

Nome:

Idade: | Sexo:

Peso: | Altura: | IMC:

TÓRAX





Cirtometria Torácica (mm):

Profundidade (mm):

Modelo disco: Medir a distância em (mm) entre os dois mamilos e reduzir 10 mm para os homens.
Modelo Ampulheta: Especialmente desenhado para as mulheres.

OBSERVAÇÕES

Tratamentos Associados:

Data:

EVOLUÇÃO/PACIENTE

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

DIAS: | DATA:

PROFUNDIDADE (mm):

Carimbo e Assinatura do médico:

VACUUM PAUHER

Resultados reais em um dos pacientes com apenas algumas semanas de uso contínuo. O tempo de tratamento pode variar de acordo com a correta utilização do equipamento assim como o nível/estado da estrutura torácica em que o paciente se encontra.



Indicação: Para tratamento clínico do Pectus Excavatum, paciente muito jovem para cirurgia, recorrência, aqueles que não aceitam a cirurgia ou usado como preparo para cirurgia. Tracionar, dar mobilidade, flexibilizando e estimulando o local da deformidade, podendo ser usado em conjunto com outros métodos conservadores, inclusive fisioterapia e durante atividade física.
Composição: Q.S.P. 100% Silicone, Visor/tampa em 100% Acrílico.
Advertências e Precauções: A eficácia depende do uso adequado do produto. Mantenha livre de objetos cortantes.
Contraindicações: Pacientes com processos infecciosos no tórax, vasculopatias (Doença de Marfan e raiz da aorta dilatada), distúrbios esqueléticos (osteogênese imperfeita, osteoporose, raquitismo), pacientes menores de 4 anos, coagulopatias (hemofilia) e problemas cardíacos. Sempre o produto deve ser prescrito com orientação de um médico.
Efeitos adversos: Podem causar hematomas leves, vermelhidão, lesões bolhosas e um pouco de dor ou desconforto pela sucção realizada pelo dispositivo. Nestes casos, sempre reduzir a pressão suspenda o uso, e procure orientação do seu médico.

Todas as informações acima e abaixo devem ser validadas pelo **seu médico responsável** e o período de utilização pode variar de acordo com o diagnóstico.

Adicione 5 minutos a mais durante cada utilização diária seguindo a tabela abaixo, é importante respeitar o processo para que seu corpo se adapte da melhor forma possível. Caso apresente desconfortos graves, procure seu médico responsável.

3x AO DIA	**SEMANA 01** - 5 Minutos **SEMANA 02** - 10 Minutos **SEMANA 03** - 15 Minutos **SEMANA 04** - 20 Minutos	3x AO DIA	**SEMANA 05** - 25 Minutos **SEMANA 06** - 30 Minutos **SEMANA 07** - 35 Minutos **SEMANA 08** - 40 Minutos

SEMANA 9 - 50 Minutos ou mais **| Consultar o Médico responsável.**

*O período informado acima deve ser aplicado **3x ao dia, pela manhã, tarde e noite.***